



מצב הנגיעות והתפתחות שדות הכותנה
דו"ח מטה הדברה, מיום 12 ביולי 2012



חוט קטן = נזק גדול

מוצאים - רואים עלייה בתעופה של ציקדות. הנגיעות בכנימות עלה או באקריות מעטה מאוד.

כע"ט - עלייה הדרגתית בתעופה ובמספר הזחלים, עם התחלה של ריסוסים. לפי מדיניות ההדברה מתחילים את הריסוסים עם **פגסוס ודומיו**. בשבוע הקרוב יהיו תוצאות של בדיקת הביוטייפים. במקומות שבהם ימצא ביוטייפ B אפשר יהיה ליישם **טייגר**, (אם לא יהיה צורך להדביר גם ציקדות). לפני יישום של טייגר מומלץ לפנות אלינו כדי לברר את נושא העמידות. שבוע לאחר ריסוס בטייגר מפסיקה בקיעת הביצים ולא רואים זחלנים. מומלץ, לכן, לקחת דגימות של עלים כדי לבדוק את יעילות הטיפול.
ניטור כנימת העש יעשה ע"י איסוף של 50 עלים מחלקה. הסף לריסוס הוא ממוצע של 5 זחלים/גלמים שנראים בעין לעלה מייצג (בתקופה זו עלה 5-7).

הליותים - ממשיכה הירידה בנגיעות ברוב השדות.

ז.ז.רוד - נגיעות בביצים ובזחלים בשדות בודדים. בדרום יש גם לכידות. חשוב להציב מלכודות בכל השדות. אלו משמשות לאינדיקציה ולהתראה. לא פעם מוצאים נגיעות בשדה ללא לכידות במלכודות, **לכן מי שעדיין לא התחיל לנטר הלקטים לנוכחות ביצים, בקיעות וזחלים, מתבקש לעשות זאת. יש לבדוק 100 הלקטים לחלקה, לפחות פעם בשבוע. הסף לריסוס הוא הימצאות של ביצים/בקיעות על 2% מההלקטים.** (הכוונה בבקיעות היא לזחלים בגודל כ-2 מ"מ).

זיפית - אין כמעט.

חלפת - כתמים בודדים.

מצב השדות - מסתמנת עלייה במספר אברי הפרי לעומת הממוצע הרב-שנתי בתאריך דומה. בהתייחס לעומס החום הצפוי רצוי להיות עם ה"יד על הדופק" בעניין הצורך בתגבור ההשקייה.
תיקון טעות - בדו"ח הקודם נכתב "השימוש במוסתי גידול באקלפי לא תמיד נכון. מומלץ להתייעץ עם המדריכים לגבי עיתוי היישום והמינון". הכוונה היתה שימוש כללי במוסתי גידול ולא ספציפית באקלפי.

בכל השדות רואים רמה גבוהה של אויבים טבעיים. תנו להם לעזור לנו.

בברכה,

אריאלה ניב ועופר גורן