



דו"ח מזיקים מיום 10.06.19



מוצצים – מעט חלקות עם כנימות עלה. כאשר ההשקיה סדירה, ניתן להגמיע קונפידור במידת הצורך- להקפיד על יישום הקונפידור בשלישי השני של ההשקיה.

הליותים - טיפול ראשון נגד הליותים, רואים תוצאות טובות.
רשימת תכשירי הדברה מורשים:

חומר פעיל	מינון סמ"ק/ד'	תכשיר
Chlorantraniliprole (200 ג'ו/לי)	20	קורגן
Flubendiamid (20%)	15 ג'ו/ד'	טאקומי
Chlorantraniliprole (100 ג'ו/לי) + Lambda Cyhalothrin (50 ג'ו/לי)	20	אמפליגו
Thiamethoxam (200 ג'ו/לי) + Chlorantraniliprole (100 ג'ו/לי)	30	דוריבו
Indoxacarb (150 ג'ו/לי)	40	אוונט
Spinetoram (60 ג'ו/לי)	50	ספרטה סופר
Emamectin Benzoate (19.2 ג'ו/לי)	40	פרוקליים
Lufenuron (40%) + Emamectin Benzoate (10%)	10 ג'ו/ד'	דנים
Lufenuron (20 ג'ו/לי) + Emamectin Benzoate (12.5 ג'ו/לי)	100	דורנים
Pyridalyl (500 ג'ו/לי)	20	בו
Spinetoram (60 ג'ו/לי) + Methoxyfenozide (300 ג'ו/לי)	40	ארמדה
Metaflumizone (240 ג'ו/לי)	100	אלוורדה
	100	פירתרואידים

חשוב לציין שתכשירי ההדברה להליותים, למעט אמפליגו, הינם קוטלי זחלים. הזחלים מפסיקים את אכילתם, אך התמותה מתרחשת לאחר 24-72 שעות לאחר ספיגת החומר. לכן, אם נכנסים לשטח בסמוך לריסוס יתכן וימצאו זחלים חיים, אך אלו לא גורמים נזקים.

ז.ורוד - התחלת פריחה בחלקות מתקדמות.

יש להתחיל ספירת רוזטות מפרח למטר – סף לטיפול הוא 5% (מתוך 100 פרחים).

אנא דווחו למדריכי ההדברה או למיכל על מציאת חלקות עם רוזטות.

יש להערך לתגבר את ה"בלבול" ולהוסיף 50 חוטים נוספים בתלייה על הגבעול המרכזי של הצמח.

מקרופומינה - אם רואים צמחים שחשודים בהתמוטטות כתוצאה ממקרופומינה יש לדווח על כך למדריכי ההדברה או למיכל.

בברכה,

מיכל אקסלרוד

אנטומולוגית המועצה