



חוט קטן = נזק גדול



מצב הנגיעות והתפתחות שדות הכותנה  
דו"ח מטה הדברה, מיום 1 ביולי 2009

**מוצצים** - מעט ציקדות, ללא נזק.

**כע"ט** - עלייה קלה בתעופה ובמספר הזחלים, (כ-2-1), לעלה מייצג (בתקופה זו העלה המייצג הוא עלה 5-7). בפגישה עלה נושא הדברת כע"ט באמצעות **קונפידור ביישום דרך מערכת ההשקיה**. מתוצאות השימוש בתכשיר בגידולים אחרים נראה כי יעילות התכשיר פחתה, כך גם נמצא בבדיקות עמידות במעבדה. יחד עם זאת מחירו הזול מעודד את הרצון להשתמש בו. אפשר לנסות ליישם קונפידור בשדות בודדים, על רמה של **1-2 זחלים לעלה מייצג**, בייחוד במקומות שצפויים בהם שני ריסוסים נגד כע"ט, כתחליף לריסוס הראשון. יעילות התכשיר תלוייה מאוד גם באופן היישום, לכן חשוב ליישמו רק במקומות בהם מערכת ההשקיה פועלת בצורה תקינה.

**הליותיס** - ברוב האזורים יש ירידה ברמת המזיק. בחלק מהשדות יש הטלה מחודשת וזחלים, ברמה המחייבת ריסוס. מהמידע שקבלנו מהאזורים, תוצאות ההדברה בתיונקס אחרי ריסוס או שניים היו טובות, ונשאר רק זחלים בודדים.

**ז.ורוד** - נמצאו רוזטת מעטות, ופה ושם לכידה בודדת בשדות "מבולבלים". כן מוצאים לכידות בודדות במלכודות שהוצבו בשדות כותנה מ-2008. יש להתחיל בבדיקת רוזטות בשדות בהם מוצאים פרח למטר. ריסוס נגד המזיק ינתן כאשר 5% מהפרחים נגועים בזחלים חיים. בשדות מפותחים, שיש בהם הלקטים בני שבועיים-שלשה יש להתחיל בבדיקת ההלקטים לנוכחות ביצים ובקיעות.

**זיפית** - זחלים בודדים.

**חלפת** - לא נצפתה נגיעות במחלה.

**מצב השדות** - התפתחות השדות טובה. קיים פיגור בצבירת אברי פרי ביחס לרב-שנתי. יש לעודד כעת שדות שנמצאים בפיגור יחסי, על-ידי השקיה ודישון. אנחנו נמצאים כ-90 יום מהזריעה, וזה השלב שבו נכנסים לצבירה של הלקטים גדולים, תוך עצירת הצימוח. בנושא ההשקיה יש להתייחס פחות למדידות גובה, ולהשתמש גם בתא לחץ. יש להמשיך בבדיקת פטוטרות, כדי לקבוע את רמת הדישון הנדרשת.

בברכה,

יובל ואריאלה - אגף הייצור וההדברה

עופר גורן - שה"ם ממ"ר כותנה