



מצב הנגיעות והתפתחות שדות הכותנה דו"ח מטה הדברה, מיום 04 ביולי 2007



השבוע החולף אופיין בעליה באוכלוסיות כע"ט וציקדות, בהמשך "טפטוף" בקיעות ושאריות הליות, בהתרחבות תפוצת הרוזטות בכל הארץ, ובחלפת ברמה נמוכה.

מוצצים - נמשכת נוכחות מועטה של כ. עלה, בד"כ ברמות לא גבוהות, לעיתים בצברים, בשדות בודדים. מגליל מערבי ומהדרום דווח על שני מוקדים בהם התפתחה אוכלוסיית כנימות גבוהה המייצרת כמויות טל דבש ניכרות. ציקדות ממשיכות להגדיל את אוכלוסייתיהן באין מעצור (שיגיע עם התחלת טיפולי הפגסוס נגד כע"ט). פשפש כותנה עדיין נוכח בשדות בד"כ ברמות לא גבוהות ומדובר היטב עם טלסטאר. באיזור בית שאן יש גם נוכחות רכנפים המודברים בריסוסי התינוקס.

כע"ט - בשבוע החולף נצפתה עליה בולטת בנוכחות בוגרי המזיק והתחלת התיישבות זחלים ביותר שדות, בעיקר בגליל המערבי ובחוף הכרמל. יש לצפות להתחלת ריסוסים ראשונים במהלך השבועיים הקרובים.

הליות - השבוע נכרה ירידה בולטת בעוצמות הנגיעות במזיק. עם זאת נמשך "טפטוף" בקיעות ובחלק מהשדות גם שאריות מהריסוס הקודם. למרות שהרוב המוחלט של תוצאות הריסוסים טובות, אנו משתדלים לקחת חלק מהשאריות לבדיקת עמידות. בינתיים ניתנים ריסוסי ניקוי, היכן שהם נדרשים, ונראה שדעיכת המזיק גולשת לחודש יולי.

ז.ורוד - ביותר ויותר שדות, במרבית האיזורים, מוצאים רוזטות. בד"כ אחוזי הנגיעות בפרחים נמוכים אך התפוצה נרחבת. טיפולים בפירתרואידים ניתנים במידת הצורך (עדיין בהיקפים מצומצמים). אנו מזכירים שוב את נוהל הספירה: יש לעבור קטעים בשדה, לספור 100 פרחים טריים ברציפות ולקטוף מתוכם את אלה הנראים כרוזטות. רק אם בבדיקת הרוזטות מסתבר שנמצאו זחלים ב 10% או יותר מ 100 הפרחים יש לתת שני טיפולים עוקבים בפירתרואידים, בהפרש של שבוע ביניהם. עם הופעת הלקטים אנו צפויים לעבור במהירות מנגיעות בפרחים לנגיעות בהלקטים. יש להתחיל לבדוק את ההלקטים לנוכחות ביצים ובקיעות (ראו תמונות באתר המועצה) ולהקפיד על תחזוקת המלכודות. בתקופה הראשונה די קשה למצוא ביצים והמלכודות מהוות כלי עזר חשוב. יש לטפל על 2-3 לכידות בשני לילות רצופים לפחות. בשלושת החודשים הקרובים תתבסס כל ההדברה על קוטלי חרקים (אח"כ נחזור לדון שוב בנושא העיקרי - סניטציה).

זיפית - האוכלוסיות נמוכות בינתיים.

חלפת - בשלב זה אין התפתחות של המחלה.

מצב השדות

השטחים נראים טוב ומתחילים לראות הלקטים גדולים. האקלפי מקדים את הפימה בכשבועיים ויש חשיבות לשמירה על כל הלקט (ז. ורוד, השקיה). בחלק מהחלקות נעשה שימוש בפיקס.

בברכה,

אגף הייצור וההדברה