



מצב הנגיעות והתפתחות שדות הכותנה
דו"ח מטה הדברה, מיום 18 ביוני 2008

מוצצים - מעט כנימות עלה. ציקדות בודדות בחלק מהשדות, בעיקר בגליל העליון. יש שדות בהם נגרם נזק מפשפש כותנה בכפתורים. הנגיעות יורדת לאחר ריסוס נגד הליותים.

כע"ט - נוכחות נמוכה של בוגרים.

הליותים - בגליל המערבי, בעמק חפר באזור הדרום ובנגב מוצאים מעט ביצים וזחלים. רוב השדות באזורים אלה רוסי בתיונקס. בשאר האזורים נגיעות נמוכה. בכל השדות מוצאים הרבה אויבים טבעיים.

ז.ז.רוד - בשדות בודדים נלכדו עשים במספר מלכודות. כן דווח על התחלת הופעה של רוזטות. **מתחילים לנטר רוזטות עם זיהוי של פרח למטר. בהליכה בשדה סופרים מדגם של 100 פרחים רצופים ומחשבים מתוכם את אחוז הרוזטות. אם יש 5% רוזטות רצוי לטפל נגד המזיק פעמיים, בהפרש 7 ימים. לכידה של עשים במלכודות הפרומון מתייחסות. אם מוצאים 1-2 עשים ללילה למלכודת, במשך שלשה לילות רצופים, יש לרסס.**

להזכירכם, אנו מתכננים לעקוב אחר התפתחות המזיק בשדות בהם נמצאה נגיעות גבוהה ברוזטות, לכן נא להודיע, בבקשה, לאריאלה על שדות שכאלה.

זיפית - זחלים בודדים באמירים.

חלפת - בשדות בודדים רואים כתמים ראשוניים.

מצב השדות –

השדות שהושקו בזמן מתפתחים יפה. כתוצאה מהחורף השחון נוצר גרעון מים בקרקע. עקב כך היה צורך במתן מנות מים גדולות מהרגיל. יש הקדמת של כשבוע בתחילת הפריחה. זו ההזדמנות לתכנן את הגידול לקיצור העונה.

בשבועות הקרובים נושא ריסון הצמיחה יעמוד על סדר היום, האם לרסן את הגידול ובאילו אמצעים.

בברכה,

יובל ואריאלה - אגף הייצור וההדברה

עפר- ממ"ר כותנה