



מצב הנגיעות והתפתחות שדות הכותנה
דו"ח מטה הדברה, מיום 26 ביוני 2012



חוט קטן = נזק גדול

מוצצים - מעט מאוד אקריות וכנימות עלה. עלייה מתונה ברמת הציקדות, בעיקר באקלפי.

כע"ט - מתחילים לראות בוגרים בשדות והתחלת התבססות. בשבוע השני של יולי ניתן יהיה לדעת באילו אזורים אפשר להשתמש בטייגר נגד כע"ט. קרוב לודאי שהביוטייפ של כע"ט יהיה B (לאור בדיקות ראשונות שנעשו השנה בגידולים אחרים), ואז נוכל להשתמש בטייגר. לפני יישום כדאי להתייעץ עם מדריכי ההדברה (הם יקבלו את תוצאות הבדיקות).

הליותים - בשדות שרוסו נגד המזיק כמעט שאין התחדשות של הנגיעות. יש לא מעט שדות שלא רוסו, כלל, נגד הליותים. אמנם אין לנו נתונים מספריים, אך רואים בשדות הרבה אויבים טבעיים – אוריוסים, ארינמלים ועכבישים.

ז.ורוד - בשבוע החולף היתה ירידה במספר הרוזטות הן באזור הדרום והן באזור גרנות. **בשדות שטופלו על רוזטות מומלץ לטפל פעמיים, בהפרש של שבוע. להזכירכם, הסף לריסוס הוא – מציאה של זחלים חיים ב-5% מהפרחים.** בשדות שבהם יש הלקטים בני שבועיים-שלושה (רואים, בעיקר, באקלפי) צריך להתחיל בבדיקת ההלקטים לנוכחות ביצים/בקיעות וזחלים.

זיפית - אין.

חלפת - אין.

מצב השדות - השדות נמצאים בשלב של תחילת הצבירה של הלקטים גדולים. המדד החשוב לבקרת הצימוח, בשלב זה, הוא הממפ"ץ, (מספר מפרקים מעל פרח צהוב בעמדה ראשונה). השימוש במווסתי גידול באקלפי לא תמיד נכון. מומלץ להתייעץ עם המדריכים לגבי עיתוי היישום והמינון.

בברכה,

עופר גורן ואריאלה ניב