



חוט קטן = נזק גדול

מצב הנגיעות והתפתחות שדות הכותנה  
דו"ח מטה הדברה, מיום 27 ביולי 2011



**מוצאים** - רמה נמוכה של ציקדות, כנימות עלה ואקריות..

**כע"ט** - עלייה באוכלוסיות של הבוגרים והזחלים מביאה לריסוסים נגד המזיק.

**בסקר של כנימות עש לבדיקת הביטיפים השונים נמצא שהכנימות בשדות שנבדקו היו מביטיפ B (למעט בשעלבים, שם 10% מהכנימות היו מביטיפ Q). כנימות אלה רגישות יותר לתכשירי ההדברה, כולל לטייגר, ולכן אנו ממליצים לרסס טייגר בחלק מהחלקות.**

**הליותיס** - בגליל המערבי, באזור גרנות, במושבי הנגב ובחלק מהשדות בעמק יזרעאל מוצאים, עדיין, ביצים וזחלים. נמשכים ריסוסים בתיונקס, בניגוד להמלצות. **להזכירכם, בבדיקות עמידות של הליותיס לתכשיר נמצאה ירידה ביעילותו, ועלינו לשמור על החומר כל עוד יש לו רישוי לשימוש בארץ.**

**ז.ז.רוד** - עשים במלכודות רואים בחלק מהשדות באזור הדרום, באזורים אחרים - לכידות בודדות. גם נגיעות בביצים ובזחלים מוצאים, כמעט, רק בדרום. בשאר אזורי הארץ רמת המזיק אפסית עד נמוכה. **ההמלצה היא לרסס בפירתרואידים. לגבי ריסוס בתכשירים מקבוצות נוספות, מומלץ לפנות למדריכים. בשדות שבהם הנגיעות גבוהה יש לשקול הקטנת המרווח בין הריסוסים.**  
**שיטת הניטור לזחל הורוד היא חיפוש ביצים על הלקטים ובקיעות בתוך ההלקטים. זו השיטה המהימנה ביותר, גם כשהריסוס מכונן נגד הבוגרים.**

**זיפית** - רמה נמוכה.

**פרודניה** - בשדות בודדים מוצאים זחלים בגדלים שונים. בגליל המערבי רוססו מספר שדות נגד המזיק.

**חלפת** - כמעט שלא מוצאים את המחלה

**מצב השדות** - בשדות שנזרעו בתאריכים המקובלים יש לסיים את הדישון עד סוף יולי. מבחינת הגידול, המגמה היא להגיע לפרחים בחלק העליון של הצמח לקראת סוף יולי, תחילת אוגוסט.

בברכה,

אריאלה ניב ועופר גורן