



מצב הנגיעות והתפתחות שדות הכותנה
דו"ח מטה הדברה, מיום 7 בספטמבר 2011

- מוצצים** - כמעט שאין כנימות עלה, ציקדות ואקריות. חלק גדול מהציקדות שרואים מוטפלות ע"י פטריה.
- כע"ט** - ירידה בבוגרים ובזחלים. נגיעות אפשר לראות בשדות רעננים של דו-גידול. יש נוכחות רבה של אקריות טורפות, הן על העלים והן על ההלקטים. **ראוי להדגיש כי מספר ימים לאחר השילוך הבוגרים עוזבים את השדה, לכן אין צורך למחר ולרסס אם מוצאים בוגרים רבים בשטח. אם מתחיל צימוח צעיר לאחר השילוך הנגיעות בבוגרים עלולה להתחדש.**
- הליותיס** - כמעט שאין.
- ז.ורוד** - עד כה הנגיעות התמקדה באזור הדרום ובחלק מהשדות באזור גרנות. כיום יש עלייה בנגיעות גם באזור חפר. **אל לנו לשכוח כי גם כשההלקטים מתקשים חייבים להקפיד על ניטור המזיק, קרי חיפוש ביצים ובקיעות על ההלקטים, וריסוסים בהתאם, עד השילוך.** בשדות נגועים מומלץ להוסיף תכשיר לקטילת הזחל הורוד בשילוך, כדי להפחית את האוכלוסיה שתכנס לתרדמה.
- זיפית** - רמת המזיק גבוהה השנה יותר מאשר בשנים קודמות, בייחוד בשדות שלא טופלו נגד זחל ורוד. **התכשירים המומלצים להדברת המזיק הם פירתרואידים וסופרתיון/סופרציד.**
- חלפת** - רמת הנגיעות ממשיכה להיות נמוכה מאוד.
- פרודניה** - עצמת המזיק רבה השנה יותר מאשר בשנים האחרונות, ושדות רבים רוססו ומרוססים. **ההדברה במג"חים טובה, בדרך כלל.**
- מצב השדות** - ברוב האזורים מסתמן קצב פתיחה יחסית מהיר של ההלקטים. יש לעקוב אחרי אחוזי הפתיחה, כדי להחליט מתי לסגור את המים, ולתכנן את השילוכים.

בברכה,

אריאלה ניב ועופר גורן