



### קמחית מנוקדת – נהלי התנהגות (עדכון)

מין כנימות קמחיות חדש בישראל, נאסף לראשונה בבקעת הירדן ביולי 2011, על עשבייה בחממה של עירית. מוצאה של קמחית זו הוא ביבשת אמריקה היא נפוצה כיום גם באזורים אחרים כמו מרכז אפריקה, סין, תת היבשת ההודית, אירן ומצרים. **נזק כבד נגרם ע"י קמחית זו לכותנה בהודו ובפקיסטן**. גם באוסטרליה היו התקפות חמורות של המזיק ב-2010. הכנימה התפשטה במהירות בארץ דרומה וצפונה, על צמחי נוי וגידולים חקלאיים והגיעה ב-2013 עד אזור פתח תקווה.

הכנימה התגלתה לראשונה בשדה כותנה באזור רבדים בשנת 2012. ב-2013 התגלתה הכנימה בכתמים בחמישה שדות באותו אזור. השנה התגלתה הכנימה ב-6 חלקות בצבר קמה ובחלקה אחת בחולדה.

**הכנימות נפוצות באמצעות עשבייה, רוח, מים, בע"ח, מיכון. הן גם מסוגלות לזחול למרחקים קצרים. הכנימות מסוגלות למצוץ את כל חלקי הצמח עד כדי התמוטטות.**

עד היום לא מצאנו תכשירים יעילים להדברת הכנימה. אנחנו בשלב של ניסויים. התוצאות תפורסמנה בבוא העת.

להלן הנחיות להתנהגות בשדות נגועים בקמחית:

1. **מגדל שמזהה בשדהו קמחית חשודה כמנוקדת מתבקש להודיע מיד למדריך ההדברה ולאריאלה או מיכל ולהתייעץ איתם בקשר לטיפול.**
2. אם הנגיעות ממוקדת באזור מצומצם יש לעקור את הצמחים ולשרוף אותם.
3. לאחר כניסת פקח/ מגדל לשדה נגוע אין להיכנס לשדות אחרים!
4. אין להיכנס באותם בגדים (שבהם נכנסתם לשטח נגוע) לשדות אחרים.
5. אפשר להיכנס לשדה הנגוע עם חליפת ריסוס ולזרוק אותה לאחר מכן.
6. יש לשטוף את הנעליים בסיום הביקור בשדה נגוע או לנקות אותן באמצעות לחץ אויר.
7. את העשבייה בשולי השדות יש להדביר, כי הקמחית מתבססת גם על צמחים אלו.
8. ריסוסים במרסס משקי יבוצעו בחלקה בסיום סבב הריסוסים של אותו יום.
9. את המרסס יש לשטוף היטב אחרי ריסוס חלקה נגועה בקמחית.
10. יש לשטוף את כל כלי העיבוד אחרי כניסה לשטח נגוע.
11. רצוי שקטיף חלקה נגועה יהיה אחרון.

כנימות שנדבקו למכנסיים לאחר  
כניסה לשדה מאולח.



זחל של עינפז ירוק (ארינמל)  
מוצץ כנימה קמחית. רואים רבים  
כאלה במוקדי הנגיעות.



**שמירה על נהלי ההתנהגות תסייע בידינו לעכב את התפשטות המזיק.**

אריאלה ניב ומיכל אקסלרוד

אנטומולוגיות המועצה