

בחינת שיטות גידול להלקטיב ורודה לצרכי מחקר

דו"ח 131-1255-08

מוגש לענף כותנה

ע"י

רמי הורביזן, מריו ריפא, עמיחי שרגל ורפי מורי

מרכז מחקר גילת,

המחלקה لأنטומולוגיה, מינהל המחבר החקלאי

הגידול הסטנדרטי בארץ של הלקטית ורודה (ה"ו) שהחל בשנות ה- 70 סיגל שיטות מאה"ב והתאים אותן לגידול המוני לצורכי מחקר ובדיקת רגישות לתחשי הדבירה קונבנציונליים. אוכלוסיות ה"ו המוגדרת במעבדה התחבסה על גלים שנאספו בשדות אзор בית שאן לפני כשלושים שנה. מאז, עבר הגידול בתchanות שונות ומיקומו הנוכחי הבלתיו הוא במרכז מחקר גילת. במרוצת השנים "רוענן" הקו ע"י הוספה פרטימ, בדרך כלל בדרגת גולם, שנאספו בשדות האזור.

כאמור, לא מתאימה שיטה זו לבחינה של ה"ו לריגישות לרעלן ה-Bt שימושי על הזחל דרך מערכת העיכול, ולצורך זה צריך לישמו בקרקע המזון. לכן התחלנו בשיטת גידול שעובדה לפי המעבדה לעמידות מזיקי כותנה לתחשי הדבירה בעיר טוסון (Tucson) באrizונה. כדי לחסוך בכוח אדם החלטנו לאחר בחינה מוקדמת להשתמש במצע מזון מלאכותי אוניברסלי המיועד לגידול גידול של זחלי מזיקים שונים תוצרת ארחה"ב, גם הוא על בסיס נבטי חיטה. במקביל לגידול הסטנדרטי במעבדה הוקם גידול באינקובטור (Stock). התוצאות של גידול זה מצביעות על כך שהזהלים יכולים לגדול על מצע זה באופן סביר - ובמידה שציריך, ניתן להגבר את כמות הזחלים דרישים לניסויים. תנאי האקלים: 27 ± 2 מ"צ, 50% לחות יחסית שנשמרים ע"י מערכת מיזוג אוויר ומחולל אדים מבוקרים ע"י בקר; ואורך יום של 14 שעות.

עשוי ה"ו זקרים ונקבות מוכנסים לצנצנת הטלה (תמונה 1) של ליטר שעשויה מפלסטיק שקוף שבצדיה חריר, לתוךו מוכנסת מבחנת מזון לבוגרים (מי סוכר עם דבש). מכסה הפלסטי חורר ועליו הולמה רשת חלון ממתכת עם חרירים עדינים. על הרשת מונה נייר מגבת שעליו מטילות הנקבות דרך הרשת, ולצורך הידוק הנייר לרשת (ה bogrim מטילים טוב יותר אם הנייר מהודק) מניחים משקלות של שקית עם חול. את הנייר עם הביצים אוספים פעמים בשבוע. הביצים מועברות לתוך מכל פוליאתילן מוקצף ("קלקר") של 0.5 ליטר מלא בחציו מצע מזון טרי (תמונה 2).



תמונה 1. צננת הטלה לבוגרי הלקטית ורודה



תמונה 2. מצע המזון בתוך מכל הקלקר שבתוכו מתפתחים הזחלים



תמונה 3. מכל הקלקר עם הזחלים הצעירים "מולבש" לתוך צננת התגלמות.



תמונה 4. הזחלים לפני התגלמות במכל הקלקר.

כדי להימנע מלוחות עודפת לביצים, מוצמד נייר הנטלה לדופן המכל. הזחלים הראשונים (נאונטים) צונחים למצע המזון ומתחפחים במשך זמן של כ- 10-14 יום לדרגת טרום גולם (חמיישית). בדרגה זו הם מתחפשים מצע יבש יותר להתגלמות ורובם מהררים את תחתית כלי הקלקר (תמונה 5) וצונחים לתוך מכל נוסף עם פתחי אוורור שמצומד

למחתית הקלקר, שם מונחים ניירות מקופלים. לאחר כ-7 ימים נשלים תהליך ההתגלמות והגולם המוכנים מועברים לצנצנות הטלה כב"ל.



תמונה 5. הגולם הגדולים מחרורים את קרקעית הקוס בדרכם לצנצנת התגלמות



תמונה 6. הזחלים מתגלמים בתוך ניירות בתחום צנצנת התגלמות.

במשך הטיפול השגרתי בגידול נתקלנו במספר בעיות כגון וירוסים הפגעים בזחלים. פתרנו בעיה זו באמצעות חיטוי גלמים וביצים של ה"ו בתמיסת פורמלין 1% במשך דקה ויבוש לאחר מכן. עדין נוצרו מספר שאלות ובעיות ש策ריך להתגבר עליהן כגון: מנייעת לחות גבואה בשלבים השונים של הגידול, התאמת כמות המזון לכמות הביצים, מספר בוגרים לצנצנת, העברת גלמים או בוגרים לצנצנות הנטלה ללא פגיעה, האם המזון המלאכותי פוגע בפוריות הנקבות לעומתם לצנצנת, העברת המזון הסטנדרטי בארץ ובחו"ל? או רק נפגעת המשיכה בין הזוגיים (כמו שנמצא במחקרים שונים). כדי לענות על שאלות אלו צריך להמשיך ולגדל את ה"ו באותה שיטה ולבוחן את השאלות הנ"ל.

כיום אנו מצליחים לספק את כל תצורת הביצים והgelמים של ה"ו הן למטרות המחקר של הקבוצה שלנו בניסויים בכוכנה מהונדסת והן לצוות שדה של מועצת הרכבתה - לניסויי שדה ומעבדה.